

ระบบการรายงาน
โรคระบาดในสุกร



แจ้งโรค

ฟาร์ม

การดำเนินการ

รอธ.

อปส.

รมว.กษ.

สคบ.

ปศจ.

ผู้ว่าฯ

ปคอ.

นายอำเภอ

เกิดโรค

ฟาร์มรายย่อย

- ทำลายสุกรโดยชดใช้ และส่งหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
- ทำความสะอาดคอกและบริเวณจุดเสี่ยง โดยเดือนแรกให้ดำเนินการทุกสัปดาห์ เดือนถัดไปดำเนินการเดือนละครั้ง
- งดการนำสุกรใหม่มาเลี้ยงอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนลงเลี้ยงใหม่ให้ swab 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ (ให้ผลลบ) จึงเลี้ยงได้แบบ Sentinel แต่หากพบผลบวกให้ทำความสะอาดทุก 3 วัน จำนวน 2 ครั้ง แล้ว Swab ซ้ำให้ผลลบติดกัน 2 ครั้ง

ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่

- ลดจำนวนประชากร โดยทำลายคอกที่ให้ผลบวก
- คอกอื่น ๆ ให้เก็บตัวอย่างน้ำลายส่งตรวจ 5 ตัว/คอก ถ้าผลตรวจเป็นลบให้เข้าโรงฆ่าภายในจังหวัด
- โรงเรือนอื่น ๆ ฝ้าระวังทางอากาศ และให้เก็บตัวอย่าง Surface swab ส่งตรวจ 3 จุด/โรงเรือน จุดละ 1 ตัวอย่าง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ (VDO call) ถ้าผลตรวจเป็นลบให้เข้าโรงฆ่าภายในจังหวัด



ฟาร์มในรัศมี

รัศมี 1 km

ฟาร์มรายย่อย

- ไม่แสดงอาการ ให้ผลักดันเข้าโรงฆ่า

ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่

- ทุกฟาร์มประเมินความเสี่ยง และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
- ฝ้าระวังโรคทางอากาศ ให้เก็บตัวอย่าง Surface swab ส่งตรวจ 3 จุด/โรงเรือน จุดละ 1 ตัวอย่าง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ (VDO call)
- ความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

รัศมี 5 km

- ฝ้าระวังโรคทางอากาศ และดูความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
- หากพบความเชื่อมโยงให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ



ระบบการรายงาน โรคระบาดในสุกร




ฟาร์ม



รอธ.



อปส.



รมว.กษ.



สคบ.



ปศจ.



ผู้ว่าฯ



การดำเนินการ

ปศอ.



นายอำเภอ

สถานประกอบการ (โรงฆ่าสัตว์)

▪ โรงฆ่าสุกรที่เกิดโรค

1. โรงฆ่าสุกร

1. ขอความร่วมมือชะลอการนำสุกรเข้าโรงฆ่าสุกร
2. ให้โรงฆ่าทำ Big cleaning
3. เก็บตัวอย่าง Surface swab 3 บริเวณ ๆ ละ 5 ตำแหน่ง
4. ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 2 สัปดาห์

3. สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรทุกแห่งที่รับซากสุกรจากโรงฆ่า

ให้สัตวแพทย์เก็บตัวอย่าง Surface swab 3 บริเวณ ๆ ละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง ทุก ๆ 2 สัปดาห์

4. ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ที่มีความเชื่อมโยง

ให้สัตวแพทย์เก็บตัวอย่าง Surface swab 3 บริเวณ (ห้องโดยสาร กระบะ และล้อ) บริเวณละ 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 ครั้ง ทุก ๆ 2 สัปดาห์ พร้อมตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 2 สัปดาห์ และเฝ้าระวังทางอาการทุกฟาร์มเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน หากพบสุกรมีอาการตามนิยามให้เก็บตัวอย่างทันที 15 ตัวอย่าง

▪ ฟาร์มที่อยู่ในรัศมี 1 km

- ลดจำนวนประชากร โดยทำลายคอกที่ให้ผลบวก
- คอกอื่น ๆ ให้เก็บตัวอย่างน้ำลายส่งตรวจ 5 ตัว/คอก ถ้าผลตรวจเป็นลบให้เข้าโรงฆ่าภายในจังหวัด
- โรงเรือนอื่น ๆ เฝ้าระวังทางอาการ และให้เก็บตัวอย่าง Surface swab ส่งตรวจ 3 จุด/โรงเรือน จุดละ 1 ตัวอย่าง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ (VDO call) ถ้าผลตรวจเป็นลบให้เข้าโรงฆ่าภายในจังหวัด

